

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضی ۲، ریاضی عمومی ۲، ریاضی کاربردی ۱

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی ۱۱۱۱۴۱۰-۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۰۷-۱۱۱۱۰۲۵

-۱ نوع رویه درجه دوم $(x+y)^2 + (x-y)^2 = z^2$ کدام است؟

۴. مخروط

۳. سهمی وار

۲. بیضی وار

۱. هذلولی وار یک پارچه

-۲ فرض کنید $z = f(x-y, x+y)$. در این صورت $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ برابر است با:

۴. صفر

۳. $2x - 2y$

۲. $x + y$

۱. $x - y$

-۳ کدام سری زیر واگر است؟

$$1 - \frac{2}{3} + \frac{4}{9} - \frac{8}{27} \dots$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

$$3 - 2 + \frac{4}{3} - \frac{8}{9} + \frac{16}{27} - \dots$$

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{9}{8} + \frac{27}{16} + \dots$$

-۴ فرض کنید $f(x, y) = 3x^2 - xy$. مقدار تقریبی $f(1.98, 1.01)$ با استفاده از دیفرانسیل برابر است با:

۴. ۱۰

۳. ۹.۷۶

۲. ۱۰.۲۴

۱. ۰.۲۴

-۵ شعاع همگرایی سری $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n$ برابر است با :

۴. صفر

۳. ۱

۲. $\frac{1}{4}$

۱. $\frac{1}{2}$

-۶ بازه همگرایی سری $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ برابر است با :

۲. $-1 \leq x < 1$

۱. $-1 < x \leq 1$

۴. $-1 < x < 1$

۳. $-1 \leq x \leq 1$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضی ۲، ریاضی عمومی ۲، ریاضی کاربردی ۱

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی ۱۱۱۱۴۱۰-۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۰۷-۱۱۱۱۰۵

$$T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+z \\ 2y+z \end{bmatrix}$$

-۷ ماتریس نمایشگر تبدیل خطی

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

-۸ مقدار $(\vec{i} \times \vec{j}) \times \vec{k}$ برابر است با:

-۱ .۴

۳. صفر

-۲ .۱

.۱ .۱

-۹ فاصله نقطه $p(-1,1,2)$ از صفحه $3x - 2y + z = 1$ برابر است با:

.۴ .۴

.۳ .۳

.۲ .۲

.۱ .۱

-۱۰ تصویر بردار $\vec{a}(3, -1, -2)$ در جهت بردار $\vec{b}(2, -3, \frac{1}{2})$ برابر است با:

.۲ .۲

.۱ .۱

(7, -13, 5) .۴

$(\frac{7}{4}, -\frac{5}{4}, \frac{3}{4})$.۳

(2, -6, 9) .۴

$(\frac{12}{7}, -\frac{4}{7}, -\frac{8}{7})$.۳

-۱۱ دترمینان ماتریس $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ برابر است با:

-۱ .۴

.۳ .۳

-۲ .۲

.۱ .۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضی ۲، ریاضی عمومی ۲، ریاضی کاربردی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ۱۱۱۱۴۱۰-۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۰۷-۱۱۱۱۰۶

-۱۲ یک بردار ویژه مربوط به مقدار ویژه $\lambda = 2$ برای ماتریس $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ برابر است با:

(1,1) .۴

(0,1) .۳

(2,1) .۲

(1,2) .۱

-۱۳ مختصات $(4,5)$ نسبت به پایه مرتبت $\{(2,3), (1,2)\}$ برابر است با:

(0,0) .۴

(5,4) .۳

(-3,2) .۲

(3,-2) .۱

-۱۴ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ حاصل برابر است با:

۱ .۲

$\frac{1}{2}$.۱

۴. در این نقطه حد ندارد.

2 .۳

-۱۵ اگر $f(x, y) = xy^2$ باشد. مشتق سویی $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j}$ در نقطه $(-3,1)$ درجهت بردار \vec{a} برابر است با:

$\frac{13}{5}\sqrt{5}$.۴

$\frac{2}{7}\sqrt{3}$.۳

$\frac{\sqrt{2}}{13}$.۲

$\frac{2}{\sqrt{5}}$.۱

-۱۶ اگر $f(x, y) = x^3y^2$, گرادیان f در نقطه $(-1, 2)$ برابر است با:

$4\vec{i} - 3\vec{j}$.۴

$12\vec{i} + \vec{j}$.۳

$12\vec{i} - 4\vec{j}$.۲

$\vec{i} - 2\vec{j}$.۱

-۱۷ تابع $f(x, y) = y^3 - x^2 + 6x - 12y + 5$ در نقطه $(3, 2)$:

۲. مینیمم مطلق دارد.

۱. ماکسیمم نسبی دارد.

۴. ماکسیمم مطلق دارد.

۳. نقطه زین اسپی دارد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضی ۲، ریاضی عمومی ۲، ریاضی کاربردی ۱

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی ۱۱۱۱۴۱۰-۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۰۷-۱۱۱۱۰۲۵

$$y = 1 - x^2 \quad \text{در } x = 1 \quad \text{برابر است با:} \quad -18$$

$$\frac{3}{\sqrt{5}} \cdot 4$$

$$\frac{2}{5\sqrt{5}} \cdot 3$$

$$5\sqrt{2} \cdot 2$$

$$3\sqrt{5} \cdot 1$$

$$\int_0^x \int_0^y e^{x^2} dy dx \quad \text{برابر است با:} \quad -19$$

$$\frac{1}{2}(e+1) \cdot 4$$

$$\frac{1}{2}(e-1) \cdot 3$$

$$e^2 - 1 \cdot 2$$

$$e \cdot 1$$

$$\int_0^1 \int_0^1 y^2 f(x, y) dx dy \quad \text{برابر است با:} \quad -20$$

$$\int_0^1 \int_1^y f(x, y) dy dx \cdot 2$$

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy dx \cdot 1$$

$$\int_1^{y^2} \int_1^0 f(x, y) dy dx \cdot 4$$

$$\int_{y^2}^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx \cdot 3$$

سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

$$\int_0^x e^{-t^2} dt \quad \text{سری توانی نمایشگر تابع} \quad -1$$

را بدست آورید.

سری توانی نمایشگر تابع

۱.۴۰ نمره

-۴ معادله صفحه ای را بنویسید که از نقطه $\left(\frac{1}{2}, 0, 3\right)$ بگذرد و بر خط ۱ با معادلات زیر عمود باشد.

$$\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{5}$$

۱.۴۰ نمره

-۳ با استفاده از اعمال سطحی مقدماتی وارون ماتریس زیر را بدست آورید.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: ریاضی ۲، ریاضی عمومی ۲، ریاضی کاربردی ۱

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی ۱۱۱۱۴۱۰-۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۰۷-۱۱۱۱۰۲۵

۱۰۴۰

-۴ نقاط ماکسیمم نسبی ، مینیمم نسبی و زین اسپی تابع $f(x, y) = x^2 - 2xy + \frac{1}{3}y^3 - 3y$ را ، در

صورت وجود تعیین کنید.

۱۰۴۰

-۵ حجم جسم محدود به صفحه $z = 1 - x - y$ و صفحه های مختصات را بیابید.

